



حبيبات قابلة للانتشار (دبليو جي)

التصنيف: حشري زراعي
التركيبة: كل ١ كغم يحتوي على: كلورانترايبرول ٢٠ غم + ثياميثوكسام ٢٠ غم
المجموعة الكيميائية: انثرانيليك دايامايد + E-ايه نيونيكوتينويد

طريقة تأثير المبيد:

مبيد حشري يجمع بين الكلورانترايبرول والثياميثوكسام يوفر عملاً مزدوجاً يستهدف عضلات الحشرات وأنظمتها العصبية، مما يؤدي إلى الشلل والموت وبالتالي مكافحة جهازية كاملة للآفات.

الخواص:

- دوفار ٤٠% دبليو جي يتميز بفعالية واسعة الطيف حيث يتحكم في مجموعة متنوعة من الآفات الحشرية المذكورة في جدول الاستعمالات.
- يوفر دوفار ٤٠% دبليو جي حماية جهازية وطويلة الأمد حيث يتم امتصاص التركيبة في أنسجة النباتات، مما يضمن مكافحة طويلة الأمد للآفات مع تقليل الحاجة إلى تكرار التطبيقات.
- من خلال احتوائه على مادتين فعاليتين تعملان باليتين مختلفتين، يساهم دوفار ٤٠% دبليو جي في منع ظهور مقاومة الآفات، مما يدعم استراتيجيات الاستدامة في مكافحة الآفات.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	طريقة ومعدل الاستعمال غم مبيد / لتر ماء	الفترة بين الرشات (يوم)	فترة الأمان (يوم)
الحمضيات (جريب فروت، الكهكوات، الليمون، البرتقال، الماندرين)	المن، نطاطات الأوراق بسيلاً الحمضيات الآسيوية، ذبابة الحمضيات السوداء، نفاقات الأوراق، الذبابة البيضاء، البق الدقيقي، الحشرة القشرية سوسة جذور الحمضيات (البالغ)، ذبابة الفاكهة، نطاط الأوراق، التريس، البق	٦ غم - ٧ غم ٧ غم - ١٠ غم ٨,٥ غم - ١٠ غم يكرر الرش عند الحاجة	٧	١
	المن، نفاقات الأوراق، الذبابة البيضاء، دودة الملفوف، دودة الذرة الصفراء، الخنفساء البرغوثية، دودة البطيخ المن، البديدان القارضة، خنفساء كلورادو، حافرات الذرة، دودة الخريف، خنفساء، نطاط الأوراق، نفاقات الأوراق، خنفساء الفلل، البق، دودة ثمار البندورة، الذبابة البيضاء الخنفساء، نطاط الأوراق، البق الدقيقي، عثة العنب	٦ غم - ١٠ غم يكرر الرش عند الحاجة		
	المن، نطاط الأوراق البق، الخنفساء البالغة	٦ غم يتم تكرار الرش عند الحاجة		
القرعيات (الشمام، البطيخ، الخيار، البامية، القرع، الكوسا) الخضروات المثمرة (الباذنجان، الفاصوليا، البندورة) والخضراوات الورقية والخضراوات الدنية	المن، نطاط الأوراق، الذبابة البيضاء، دودة الملفوف، دودة الذرة الصفراء، الخنفساء البرغوثية، دودة البطيخ المن، البديدان القارضة، خنفساء كلورادو، حافرات الذرة، دودة الخريف، خنفساء، نطاط الأوراق، نفاقات الأوراق، خنفساء الفلل، البق، دودة ثمار البندورة، الذبابة البيضاء الخنفساء، نطاط الأوراق، البق الدقيقي، عثة العنب	٦ غم - ١٠ غم يكرر الرش عند الحاجة	١٤	١٤
التفاحيات (التفاح، كمحكات، الاجاص) واللوزيات (الشمش والدرق)	عثة ثمار التفاح، دودة ثمار الخضراء، نطاط الأوراق من التفاح من حبوب التفاح، البق الدقيقي، الخنفساء، الذبابة البيضاء، البق بسيلاً الاجاص	٦ غم - ١٠ غم ٨,٥ غم - ١٠ غم ١ غم - ١,٥ غم يكرر الرش عند الحاجة	١٠	١٤
الفراولة	المن، نطاط الأوراق البق، الخنفساء البالغة	٦ غم - ١٠ غم ٨,٥ غم - ١٠ غم ١ غم - ١,٥ غم يكرر الرش عند الحاجة		
	المن، نطاط الأوراق البق، الخنفساء البالغة	٦ غم - ١٠ غم ٨,٥ غم - ١٠ غم ١ غم - ١,٥ غم يكرر الرش عند الحاجة		

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات وينصح بعمل تجربة خلط قبل الرش.

ملاحظات:

- لا ينصح بدخول الحقل المرشوش الا بعد مرور ٢٤ ساعة من آخر معاملة بالمبيد
- لا يستخدم في حدائق المنازل أو على نباتات الزينة وفي البيوت البلاستيكية وعلى النباتات المخصصة للتشتيل وعلى المحاصيل المعاملة بذورها بمادة الثياميثوكسام.
- لا يتم تطبيقه في أنظمة الري عدا البطاطا.
- يتم استخدام المادة اللاصقة على محاصيل معينة وباستخدام نظام الري بالرش.